



Vragen

Wanneer u vragen heeft kunt u ons bellen.
Flebologisch Centrum De zuid Hollandse eilanden.
Geopend maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 0187-330150
Op de andere dagen kunt u zich wenden tot de
poli chirurgie, telefoon 0187-607100
U kunt ons ook mailen met uw vragen. U krijgt zo snel
mogelijk antwoord.

Wat te doen na de ingreep

Direct na de ingreep wordt de steunkous bij u aan-
gedaan en moet deze voor twee dagen aanblijven.
In principe kunt u alles doen behalve bijvoorbeeld
zwaar tillen en paardrijden.
De hechtingen lossen vanzelf op.

Na ongeveer 3 maanden komt u terug voor controle
en kan u dan eventueel worden gescleroseerd, neem
daarom bij ieder bezoek de steunkousen mee!

Zwemmen mag de eerste week niet i.v.m. infectie
gevaar.



De Hart & Vaatgroep



Hartstichting



Bezoekadres

Centrum voor Flebologie en Lasertherapie
'De Zuid-Hollandse Eilanden'
'Het Nieuwe Weergors'
Vliet 4
3224 HE Hellevoetsluis
telefoon: 0181 - 330150
info@flebologisch-centrum.nl
www.flebologisch-centrum.nl



Het Flebologisch Centrum werkt samen met het




HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

PERFORANTECTOMIE



HET FLEBOLOGISCH CENTRUM
'DE ZUID-HOLLANDSE EILANDEN'
IN HELLEVOETSLUIS BEHANDELT
AFWIJKINGEN AAN HET
CIRCULATIESTELSEL VAN DE BENEN,
ZOALS SPATADEREN.





Op deze plaats kan later zelfs een open wond ontstaan (ulcus cruris venosum).

Door middel van duplex onderzoek kan een perforant in beeld worden gebracht. Tijdens dit onderzoek kan duidelijk worden aangetoond dat de perforant (de verbindende aderen) dikker /groter is dan in de gezonde situatie.

Waarom deze ingreep?

Deze ingreep wordt uitgevoerd om niet goed functionerende perforerende aderen te dichtten. Zichtbare spataderen kunnen dan succesvoller worden gescleroseerd (wegspuiten van spataderen). Ook wordt deze ingreep gedaan ter voorkoming van of juist ter behandeling van een open been (ulcus cruris venosum).



Wat is een perforant?

Een perforant is een door het bindweefselvlies doorborende ader, die een verbinding vormt tussen het oppervlakkige en het diepe aderlijk systeem (zie afbeelding). In een perforant is de stroomrichting van het bloed omgekeerd, waardoor de druk binnen de ader toeneemt. De verbindende ader zal hierdoor minder goed functioneren en pijnklachten kunnen veroorzaken ter plaatsen.

De perforant zelf veroorzaakt geen pijn, maar de plek waar deze door het bindweefselvlies (membraan) gaat, geeft uitstralende pijn rondom. Bovendien geeft het vaak bij aanraking het gevoel een blauwe plek te zijn. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal de ader een spatader zijn.

Bij langdurig minder goed functionerende aderen (veneuze insufficiëntie) kan ter hoogte van een perforant huidverandering en/of verkleuring ontstaan.

Wat is een perforantectomie?

Dit is het chirurgisch doornemen van een perforerende (doorborende) ader door het bindweefselvlies (membraan). Door middel van het duplex onderzoek is vastgesteld dat de perforant niet goed functioneert en moet worden doorgenomen. Dit zal worden gedaan op de kleine poliklinische OK, meestal in het Nieuwe Weergors te Hellevoetsluis.

De echolaborant zal, 15 minuten voor de ingreep, de perforant met een stift aftekenen op het been in staand en daarna liggend houding.

Vervolgens zal de chirurg op de poliklinische OK, onder lokale verdoving, een kleine incisie maken en de perforant doornemen. Wanneer de ader is gedicht wordt de incisie gehecht met oplosbaar hecht draad en hoeft dus niet verwijderd te worden.

Meestal bent u met een 30 minuten klaar.

Voor de ingreep

Indien u een steunkous recept heeft meegekregen na de duplex dient u deze te laten aanmeten. Zo niet, dan ligt er een verbandkous voor u klaar.

Voor het eerste gebruik van de steunkous is het handig om de steunkousen een aantal keren te dragen zodat de kous wat soepeler is. Desnoods een aantal keren de kous over een 2 liter fles heen schuiven en even laten staan.

Eventueel kunt u 1 uur voor de ingreep 2 tabletten paracetamol 500 mg nemen. Dit ter voorkoming van eventuele pijnklachten.

De steunkous dient u mee te nemen naar het ziekenhuis voor de ingreep.