

Poli Flebologie



HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS



VNUS Closure Fast ®/
EVLT Behandeling.



Behandeling

- U mag voor de behandeling gewoon eten
- Uur van te voren 2x500mg Paracetamol.
- 30 minuten voor de ingreep de Anti Biotica profylaxe (wanneer dit met u is besproken)
- Op de dag van de ingreep bij het ontbijt graag het 1e spuitje tegen de trombose



Mee te brengen

- Indien u een steunkous klasse II heeft deze meenemen.
- In de andere gevallen is de TEK/verbandkous aangemeten en ligt deze voor u klaar.
- Poliklinisch in Hellevoetsluis poli nr 8
- Alles onder plaatselijke verdoving.



Behandeling

- U wordt verzocht op de behandeltafel plaats te nemen.
- Chirurg kijkt met echo het te behandelen vat.
- Het been wordt ontsmet, en u wordt afgedekt met steriele lakens.




Behandeling

- Onder plaatselijke verdoving wordt de katheter in de spatader geschoven (dit gebeurt meestal ter hoogte van de knie bij VSM, bij VSP op de kuit).
- Met de echo wordt gecontroleerd of de katheter goed ligt.
- Verdoving wordt door middel van injectienaald gespoten rond de spatader.
- Functie hiervan is omliggend weefsel te beschermen voor de hitte die vrij komt en dat u er niets van voelt.

Behandeling



- Katheter wordt in de spatader ingebracht.
- Gedurende 5 minuten per behandelend vat.



Na de Behandeling

- Na de behandeling wordt er een lange pleister geplakt, dit om het vocht op te vangen wat ingespoten is met de verdoving. Deze mag na 48 uur verwijderd worden.
- Steunkous wordt aangetrokken, en ook deze mag pas na 48 uur uit getrokken worden (dus ook 's nachts aanhouden).




Aandachtspunten na behandeling

- Advies is regelmatig lopen/ fietsen om trekkend gevoel te verminderen.
- langdurig staan, zwaar tillen vermijden.
- Paardrijden / motorrijden/ intensief sporten/ kracht training met benen is niet toegestaan gedurende een week.
- Bloeduitstortingen prikplekken.



Pijnklachten na behandeling

- Krampachtig / rood /warm aanvoelen
- Eventueel pijnmedicatie nemen
- Behandelde spatader wordt harde streng / daarna knobbelig
- De spatader kan donkere streng worden (gestold bloed)



Ondanks de poliklinisch ingreep moet men rekening houden met napijnen/hinder welke sterk per patient kunnen verschillen van enkele weken tot meerdere maanden



Na controle / na behandeling

- Na ongeveer 10 weken kunt u terug op poli komen voor nacontrole, zodat zonodig verdere behandeling kan worden besproken.
- Contact opnemen bij ontstekingsverschijnselen of andere vragen.